


2023 年普通高中学业水平选择性考试（广东卷）

地理

本试卷满分 100 分，考试时间 75 分钟。


一、选择题：本大题共 16 小题，每小题 3 分，共 48 分。在每小题列出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

进入 21 世纪，长江下游跨江桥隧建设发展迅速。有研究统计，2000 年长江下游公路跨江桥隧通道仅 4 条，2008 年为 9 条，2016 年增至 17 条。图示意这三个年份长江下游两岸部分市县距江岸不同直线距离区间的车辆，到达对岸所需平均时间的变化。据此完成下面小题。



1. 与 2000—2008 年相比，2008—2016 年期间长江下游两岸不同直线距离区间车辆平均跨江耗时的缩减量均表现为（ ）
A. 大幅增加 B. 保持不变 C. 略有增加 D. 有所减少
2. 由图中信息可判断，长江下游南岸市县比北岸市县（ ）
A. 公路网更完善 B. 车流量更大
C. 人口更为稠密 D. 河网更密集

露点温度是指气压不变、水汽无增减情况下，未饱和空气因冷却而达到饱和时的温度。图所示的是 2020 年 11 月 18—19 日吉林省某气象站记录的一次较强降水过程相关信息。据此完成下面小题。



3. 此次降水过程呈现的天气变化依次是（ ）

- A. 风雨交加、冻雨夹雪、雪花纷飞
- B. 疾风骤雨、雪花纷飞、冻雨夹雪
- C. 雪花纷飞、风雨交加、冻雨夹雪
- D. 风和日丽、冻雨夹雪、和风细雨

4. 此次天气过程形成的主要原因是 ()

- A. 对流旺盛
- B. 逆温增强
- C. 暖锋经过
- D. 冷锋过境

珠江三角洲地区某侨乡村，现存大量古建筑和水上碉楼。20世纪90年代至21世纪初，随着珠三角地区工业化快速推进，该村人口持续外流，村落逐渐空心化。近10年来，该村特色产业发展迅速，回流人口明显增多，成为乡村振兴的成功范例。据此完成下面小题。


5. 导致该村20世纪90年代至21世纪初人口持续外流的主要原因是 ()

- A. 前往海外寻亲访友
- B. 被城市就业机会吸引
- C. 人口已超合理容量
- D. 人口老龄化逐渐加剧

6. 近10年来，该村发展迅速的特色产业最可能是 ()

- A. 农业种植和水产养殖
- B. 公共卫生和文化教育
- C. 旅游服务和文化创意
- D. 先进制造和科技研发

浙江省温岭市制鞋业发达，Z镇是最大制鞋基地，其制鞋业始于20世纪80年代。近年来，随着电商的发展，该镇制鞋业趋于更加灵活化。图示意Z镇制鞋业发展历程。据此完成下面小题。





7. 电商的发展对该镇制鞋业带来的最直接影响是 ()

- A. 制鞋技术提升、生产效率提高
- B. 生产要素流动加快、市场扩大
- C. 生产更加集中、营销渠道稳定
- D. 制鞋工艺更加标准化、统一化

8. 进入智造型阶段，该镇制鞋业最显著的变化是 ()

- A. 原料汇聚及供应渠道增多
- B. 加工生产及供货周期变短
- C. 研发设计及服务水平提高
- D. 成品库存及集散能力增强

2019年5月28日，某科研团队利用往返式探空气球，在长沙观测站(28° 07' N, 112° 17' E)收集了四个不同时刻释放的气球所记录到的太阳短波辐射量变化信息(图a)。图b为其中某一时刻对应的太阳光照示意图(阴影部分代表黑夜)。据此完成下面小题。




9. 在图 a 中，符合图 b 示意时刻所释放气球接收到的太阳短波辐射量变化的曲线是 ()

- A. ① B. ② C. ③ D. ④

10. 这次探测结果显示，白昼期间气球接收到的太阳短波辐射量随高度增加而增多，是因为随高度增加 ()

- A. CO₂ 量减少 B. 空气温度降低
C. 大气越稀薄 D. 人类干扰越小

某中学学生在山西省太行山青龙峡景区研学活动中发现，这里是典型高山峡谷地貌，两岸岩壁直立，软硬岩层交互，陡壁下常有崩塌物堆积，崩塌物主要来自硬岩层。图是同学们绘制的岩体崩塌过程示意图。据此完成下面小题。




11. 崩塌物主要来自硬岩层，是因为 ()

- A. 软岩受风化剥蚀更快 B. 硬岩的重力作用更大
C. 软岩抗侵蚀能力更强 D. 硬岩水土流失更严重

12. 同学们提出的以下预防崩塌危害措施中，不能运用地理信息系统完成的是 ()

- A. 岩土变形预警 B. 危险岩体清除
C. 气象水文预报 D. 游客行为监管

草毡层是由土壤物质与植物根系交缠而成的毡状表土层，主要分布在高寒和极地地区。青藏高原上的草毡层，虽然厚度不大，但坚韧且富有弹性，是维护青藏高原生态安全的重要屏障；与基岩风化物为成土母质的土壤不同，这里草毡层中的细土物质以风力搬运输入的外源粉尘为主。图示意青藏高原某地草毡层景观。据此完成下面小题。



13. 青藏高原上草毡层中风力搬运输入的粉尘物质增加将 ()


- A. 有利于土壤有机质积累
- B. 降低土壤的持水能力
- C. 加快下覆基岩风化破碎
- D. 有助于耕作土壤形成

14. 如果青藏高原某区域草毡层遭到破坏，会导致当地 ()

- ①草地初级生产力降低
- ②冻土融化速率减缓
- ③温室气体排放量减少
- ④地表侵蚀强度增加

- A. ①②
- B. ②③
- C. ①④
- D. ③④

图示意长江三角洲地区某特大城市近几十年来城市各要素向郊区扩散的三个阶段。据此完成下面小题。



15. 由阶段 I 发展到阶段 II，城市各要素向郊区扩散的推动力主要是 ()

- A. 人口增长、社区改造
B. 社区改造、政府引导
C. 企业参与、人口增长
D. 政府引导、企业参与

16. 与阶段 I 相比，阶段 III 郊区演变的最显著特征是 ()

- A. 产业分布均衡
B. 产城融合加强
C. 空间结构单一
D. 居住功能弱化

二、非选择题：共 52 分。考生根据要求作答。

17. 阅读图文资料，完成下列要求。

龙胆草(图 1)是我国传统中药材，喜湿、怕涝，适宜在气候温凉、土壤微酸性的环境生长。辽宁省清原满族自治县位于长白山余脉，素有“八山一水一分田”之称(图 2 为该县三维地形图)，大部分地区土壤 pH 介于 5.5~6.8 之间。该县是我国优质龙胆草种源地和最大的栽培基地，种植历史较长。2008 年，“清原龙胆”被认定为国家地理标志产品。之前，该县龙胆草生产以散户为主，多为家庭作坊式初加工，加工企业少，产品售价低。近年来，该县通过“龙头企业十农户+基地”这种新型组织模式(图 3)，提高了龙胆草产业效益。



图 1




图 2





图 3


- (1) 分析该县适宜龙胆草大规模种植的自然地理条件。
- (2) 简述农户参与图 3 所示的新型组织模式能获得哪些方面的益处。
- (3) 该县如何利用“清原龙胆”品牌优势进一步打造优质龙胆草产业基地？

18. 阅读图文资料，完成下列要求。

巴音河流域位于盛行西风的柴达木盆地东北边缘地区。巴音河在宗务隆山以南形成了大面积的冲洪积扇；2015 年 12 月，当地对该区域巴音河出山口长约 4km 的河道进行了硬化。图 a 示意巴音河冲洪积扇及周边地区地理环境特征；图 b 示意图 a 中 P1、P2 两点之间的水文地质剖面。



(a)




(b)

- (1) 分析图 a 中布赫特山西南麓山前区域发育较大面积沙丘的主要成因。
- (2) 如图 b 所示，巴音河河道所在区域地下水含水层明显较厚，且在河道以南出现地下水溢出。请从地质构造角度，分析形成这两种现象的原因。
- (3) 指出巴音河出山口段河道硬化对其下游地下水位变化的影响，并说明理由。

19. 阅读图文资料，完成下列要求。

日本海背靠亚欧大陆，冬季其西部沿岸海域常有海冰形成。洋流系统对日本海上、下层海水交换强度具有重要影响。在寒冷的末次冰期最盛期（距今约 21—18 千年），日本海几乎与外海分隔。在随后气候转暖过程中，于距今约 17—15 千年期间再次变冷，日本海西部近岸上、下层海水交换强度显著降低。距今约 8 千年以来，日本海西、中和南部海域的上、下层海水交换强度才呈现同步增强特征。图示意日本海位置及其现代洋流分布状况。



- (1) 分析在距今约 17—15 千年期间，日本海西部近岸海域上、下层海水交换强度显著降低的原因。
- (2) 有人认为现代对马暖流形成于距今约 8 千年，但也有人并不认同。基于所给材料，请表明你支持的观点，并说明理由。

2023 年普通高中学业水平选择性考试（广东卷）

地理

本试卷满分 100 分，考试时间 75 分钟。

一、选择题：本大题共 16 小题，每小题 3 分，共 48 分。在每小题列出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

【1~2 题答案】

【答案】1. D 2. A

【3~4 题答案】

【答案】3. A 4. D

【5~6 题答案】

【答案】5. B 6. C

【7~8 题答案】

【答案】7. B 8. C

【9~10 题答案】

【答案】9. A 10. C

【11~12 题答案】

【答案】11. A 12. B

【13~14 题答案】

【答案】13. D 14. C

【15~16 题答案】

【答案】15. D 16. B

二、非选择题：共 52 分。考生根据要求作答。

【17 题答案】

【答案】（1）该县位于辽宁省，属温带季风气候区，降水较多，空气潮湿；位于长白山余脉，地势起伏大，排水条件好；位于中纬度山区，气候温凉；土壤为微酸性，适宜龙胆草种植。

（2）农户为基地提供土地和劳动力，可将资源优势转化为经济优势，增加收入；与龙头企业签订合同，风险共担，提升农户抗风险能力；龙头企业利于形成品牌效应，提高当地经济收益；基地知识溢出为农户服务，促进农户提升种植技能。

（3）规范加工工厂，提升产品加工能力；发展下游产业，丰富产品类型，提升加工能力，延长产业链；加大科技投入，培育良种；促进产业融合，进行农旅产业融合发展；研发高品质产品，提升产品附加值；打

造品牌效应，拓宽市场。

【18 题答案】

【答案】(1) 布赫特山以西地区细粒碎屑物质丰富；受盛行西风搬运，形成风沙流；受西北-东南走向的布赫特山脉阻挡，叠加山丘北侧局地地形影响，有利于沙丘发育和存续。

(2) 含水层较厚的原因：此区域为向斜构造，利于冲洪积物堆积；断层加剧凹陷，进一步增加冲洪积物堆积厚度，导致含水层明显增厚。

地下水在河道以南溢出的原因：德南隆起是背斜构造，阻挡地下水水平运动，抬升地下水位；地下水通过河道南侧断层处形成的通道，溢出地表。

(3) 影响：造成地下水水位抬升。

理由：该段硬化河道减少了出山口区河水下渗，加大了向下游的径流量；下游河段下渗量增大。

【19 题答案】

【答案】(1) 距今约 17—15 千年期间，气候变冷，日本海西部近岸海域表层海水迅速冷却，形成海冰，上、下层海水密度差减小；冬季风势力增强，对马暖流势力减弱；北部海域结冰，寒流减弱，寒暖流交汇减弱，上、下层海水交换强度降低；气温降低，南北侧环流减弱，西部上、下层洋流交换减弱。

(2) 赞同：现代对马暖流形成于距今约 8 千年。原因：对马暖流的入侵提高了表层和底层水体交换，而且距今 8 千年以来，日本海西部、中部和南部海域的上、下层海水交换强度同步增强。

或不赞同：现代对马暖流形成于距今约 8 千年。原因：日本海西部、中部和南部海域的上、下层海水交换强度受夏季风、冬季风、洋流共同影响，夏季风影响日本海表层水体层化，而东亚冬季风影响日本海西部海冰的形成和深层水体垂向对流；对马暖流的入侵提高了表层和底层水体交换。